Des croissances atones

La vague de chaleur combinée à l'absence de pluies significatives en juillet rendent les croissances d'herbe extrêmement faibles, voire nulles. Dans tous les cas, apportez des fourrages à l’auge pour garder un peu de hauteur d’herbe. Une végétation qui n’a pas plus de feuille verte (paillasson) aura une capacité de reprise extrêmement lente au retour des pluies. Sacrifiez une parcelle "parking" ou laissez les vaches au bâtiment, pour mieux valoriser les repousses qui reviendront aux prochaines pluies significatives.

La ferme du **Lycée de Montmorot** (mesurée lundi) a 10kg de croissance moyenne, avec des prairies temporaires riches en Trèfle blanc et une hauteur d'herbe sur pied significative, grâce à une augmentation de la surface de pâturage (pâturage de repousses après foin et luzernes éloignées du point de traite).

Le **Gaec de la Frête Arbez à Esserval-Tartre** a une croissance nulle sur l’ensemble des parcelles. Les coteaux exposés sont en train de griller, et les zones plus humides du pâturage ont une croissance proche du néant. Les vaches pâturent dans des hauteurs d’herbe faibles (6cm maximum) et rasent les prairies, pénalisant les futures repousses quand la pluie reviendra.

Les prairies jaunissent même à 900m d’altitude.

Vincent Mamet, Animateur technique
06 82 91 10 48 vincent.mamet@evajura.com